




Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • № 1 (43) 2015

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТРАВМА ГЛАЗА: что необходимо и чего делать нельзя

Любая травма глаза - это угрожающее состояние для зрения животного. Не занимайтесь самолечением, срочно обратитесь к специалисту - ветеринарному офтальмологу! Только специалист-офтальмолог, а не врач общего приема может определить степень повреждения и выстроить верную тактику лечения.

Если возможности приехать к врачу нет - можно попытаться оказать первую помощь самостоятельно. Сначала вымойте руки, протрите их спиртовой салфеткой. Посадите животное большим пальцем осторожно раздвиньте веки и осмотрите поврежденный глаз. Если в глазу имеется инородное поверхностное тело, его возможно удалить марлевым тампоном. После удаления инородного тела промойте глаз каплями с антибиотиком. Когда животное не дает открыть поврежденный глаз, не делайте этого силой - так вы можете нанести дополнительную травму глазу и ухудшить его состояние. При травме глаза химическими веществами, реагентами для снега, горячей водой или жиром обильно промойте глаз чистой водой в течение 5-10 минут.

Основными симптомами травм глазного яблока являются:

- блефароспазм - животное не открывает глаз, держит его все время в прищуренном состоянии;

- сильная боль в глазу - ваш питомец не дает никому даже дотронуться до пораженного глаза;
- у животного наблюдается выраженное слезотечение и светобоязнь;
- ухудшение зрения и обильные выделения из полости конъюнктивы.

О вреде самолечения

Не нужно ни в коем случае заниматься самолечением. Опытные собаководы, заводчики со стажем этим грешат и считают себя вправе спокойно консультировать своих друзей и знакомых: "У моей собаки было то же самое, закапайте это, и все пройдет". Собаки подвержены более 100 глазным заболеваниям, причем каждое из них имеет различные формы. Даже при одном и том же заболевании на одной его стадии какой-то препарат применять можно, а на другой стадии этот же препарат - категорически нельзя.

Как ни парадоксально, но наиболее тяжелые больные попадают к ветеринару от опытных собаководов. Вылечив одну собаку, они начинают рабо-

ПРИ ТРАВМАХ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ:

- промывать глаза перекисью водорода. У многих собак из-за этого вызывает токсический ожог глаза, после которого начинаются различные осложнения. Ожог может возникнуть при лечении собак народными средствами, например, владельцы пробуют вылечить "бородавки" (как они их называют) чистотелом;
- давать животному тереть глаз. Это вызывает раздражение, вдобавок животное еще больше может повредить глаз и занести инфекцию. Если животное чешет глаз, наденьте на него защитный воротник. Защитные воротники продаются во всех зоомагазинах;
- давить и силой пытаться открыть поврежденный глаз. При этом если травма прободная, могут вытечь все внутренние оболочки глаза;
- самостоятельно закапывать глазные гормональные капли или закладывать мази, содержащие преднизолон или дексаметазон. Они без назначения врача могут оказаться опасными и ухудшить состояние.

тать по этой схеме, и когда их упрекаешь в том, что они не обратились к врачу, они отвечают: "А знаете, у нас три года назад было то же самое, врач назначил то-то и то-то, собаку вылечили. Этот случай такой же, вот мы и решили не обращаться". В любом случае необходимо все-таки показать собаку специалисту.

Как узнать, что у собаки стало ухудшаться зрение?

На это владельца должны навести следующие признаки:

- животное плохо ориентируется в темноте;
- при выходе из освещенного подъезда на темную улицу собака стоит минуту, адаптируясь к темноте, и только потом начинает идти по улице;
- прогулка в новых местах вызывают у собаки страх и неуверенность;
- животное боится спускаться и подниматься по лестнице;
- питомец плохо ориентируется в незнакомом месте;
- при игре животное промахивается мимо игрушек, перестает ловить мячик,
- а в последующем перестает играть полностью;
- собаке сложно найти миску, поилку и другие знакомые вещи;
- на прогулках собака дезориентирована, ведет себя с большой осторожностью, желание бегать и прыгать отсутствует, животное передвигается по запаху носом в землю;
- у животного меняется поведение: оно много спит, присутствует тревога, угнетенное состояние, слабость, отсутствует желание двигаться.

Советы на случай, если ваш питомец ослеп

Собаки и кошки великолепно адаптируются к слепоте. Они замещают зрение другими органами чувств, прекрасный слух и вся палитра запахов быстро компенсируют животным отсутствие зрительных образов.

Вы можете обучить собаку командам, которые принесут ей пользу и облегчат жизнь: это команды "стоп", "медленнее", "шаг влево", "шаг вправо".

Животные, терявшие зрение постепенно (например, при прогрессирующей атрофии сетчатки), гораздо быстрее приспосабливаются к слепоте, чем потерявшие зрение внезапно. Молодые собаки и кошки быстрее восстанавливаются при потере зрения, чем пожилые.

Итак, если ваше животное ослепло:

- всегда оставляйте в доме открытыми двери;
- не переставляйте мебель на другие места, чтобы животное не запуталось. Даже один перемещенный на другое место предмет может сильно осложнить собаке жизнь. После того как вы поели, переместите стулья на их первоначальное место, закрывайте все шкафы и ящики, иначе животное может в них врезаться;
- всегда оставляйте миску с едой в одном и том же месте. Вы поможете собаке быстрее найти миску с едой, если под нее положить источники аромата ванили или мяты;
- острые углы мебели на время адаптации к темноте заклейте мягкой тканью, чтобы животное не поранилось;
- если вы живете в загородном доме, заблокируйте лестницу, так как собака может упасть с нее, и оградите бассейн;
- на прогулку по улице выводите собаку на коротком поводке, чтобы животное не запуталось в поводке. Ходите гулять с собакой по одному и тому же маршруту, не меняя его;
- на прогулках избегайте мест с большим количеством деревьев или колючим кустарником;
- постарайтесь больше времени с животным проводить на открытых местах или полянах, где оно не сможет пораниться о кустарник или дерево.



Обирай, інакше

2015

СІЧЕНЬ

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	8	15	22 29
ПТ	2	9	16	23 30
СБ	3	10	17	24 31
НД	4	11	18	25

ЛЮТИЙ

2	9	16	23
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28
1	8	15	22

БЕРЕЗЕНЬ

ПН	2	9	16	23	30
ВТ	3	10	17	24	31
СР	4	11	18	25	
ЧТ	5	12	19	26	
ПТ	6	13	20	27	
СБ	7	14	21	28	
НД	1	8	15	22	29

КВІТЕНЬ

6	13	20	27
7	14	21	28
1	8	15	22 29
2	9	16	23 30
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26

ТРАВЕНЬ

ПН	4	11	18	25
ВТ	5	12	19	26
СР	6	13	20	27
ЧТ	7	14	21	28
ПТ	1	8	15	22 29
СБ	2	9	16	23 30
НД	3	10	17	24 31

ЧЕРВЕНЬ

1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	



РАБІО

RABISTAR

ВАКЦИНА ПРО

УКРВЕТПРОМПОСТАЧ



м. Бровари

УКРВЕТПРОМПОСТАЧ

07403 Київська обл., м. Бровари,
вул. Будьонного, 23-а

тел./факс: (045 94) 6-48-49, 6-42-95, 5-54-13;

www.vetsnab.com.ua

e-mail: info@vetsnab.com.ua

ше програєш!



2015

ЛИПЕНЬ

6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	

СЕРПЕНЬ

3	10	17	24	31	ПН
4	11	18	25		ВТ
5	12	19	26		СР
6	13	20	27		ЧТ
7	14	21	28		ПТ
1	8	15	22	29	СБ
2	9	16	23	30	НД

ВЕРЕСЕНЬ

7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

ЖОВТЕНЬ

5	12	19	26	ПН	
6	13	20	27	ВТ	
7	14	21	28	СР	
1	8	15	22	29	ЧТ
2	9	16	23	30	ПТ
3	10	17	24	31	СБ
4	11	18	25		НД

ЛИСТОПАД

2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29

ГРУДЕНЬ

7	14	21	28	ПН	
1	8	15	22	29	ВТ
2	9	16	23	30	СР
3	10	17	24	31	ЧТ
4	11	18	25		ПТ
5	12	19	26		СБ
6	13	20	27		НД

СТАР

ПРОТИ СКАЗУ



ВАЖНО ЗНАТЬ

ЕСЛИ КОШКА КАШЛЯЕТ

Ваша кошка кашляет? Для начала убедитесь, что это действительно кашель! Кашель – это защитный рефлекторный механизм, необходимый, чтобы выталкивать мелкие инородные предметы или мокроту. Стенки дыхательных путей покрыты множеством рецепторов, которые при раздражении активируются и провоцируют резкий выдох через рот. Иногда кашель путают с чиханием или позывами на рвоту.



К слову сказать, у собак кашель бывает гораздо чаще. Кашель для кошки – достаточно редкий симптом и часто является тревожным признаком. В чем же может быть причина?

Проблемы с сердцем

Для начала рассмотрим наиболее частое заблуждение, что у кошки, как и у собаки, кашель является симптомом сердечной недостаточности. Это не так, при заболевании сердца у кошки ведущими симптомами является одышка и тяжелое хриплое дыхание. Поэтому если ваша кошка дышит с открытым ртом, следует обратиться к кардиологу. Более того, часто кардиологические патологии могут протекать вовсе без выраженной симптоматики, кошки просто неактивные и много спят.

Астма

Наиболее частой причиной кашля у кошки является астма кошек. Как и у человека, кашель при этом является причиной аллергической реакции – обычно на домашнюю пыль. Чаще первые признаки болезни проявляются в возрасте 3–5 лет. Если кашель редкий и не доставляет животному сильного дискомфорта, лечение проводят при обострении симптомов. Но, к сожалению, при тяжелых состояниях требуется постоянная терапия кортикостероидами. Возможно применение небулайзеров, также отлично помогает исключение аллергенов из жизни кошки.

Инфекции

Другой распространенной причиной кашля являются инфекционные заболевания (кальцивироз, ринотрахеит, микоплазмоз и т.д.), осложненные воспалением верхних дыхательных путей и пневмонией. При этом в первую очередь стоит обратить внимание на общее угнетенное состояние, некоторые животные отказываются от еды и худеют, так как инфекция может поражать носовые пазухи и рот, из-за чего у кошки притупляется обоняние и снижается аппетит. Особо внимательными надо быть тем, у кого животные не вакцинированы и имели контакт с уличными собратьями. Почти все заболевания передаются воздушно-капельным путем, а значит, очень контагиозные.

Гельминты

До сих пор нередко причиной кашля становится глистная инвазия. Чаще такая патология встречается у молодых, подобранных на улице животных. Но если не проводить регулярную дегельминтизацию, может развиваться у любой кошки. Причина – в рефлекторном раздражении пищевода и диафрагмы гельминтами, активно заселившими желудок и кишечник. При данной патологии необходимо применять антипаразитарные препараты, но надо быть крайне осторожными, потому что организм, ослабленный гельминтами, может серьезно пострадать при массовой их гибели, также может развиваться понос и рвота, что увеличит потерю жидкости. Особо слабым котяткам препараты лучше давать под наблюдением врача и с инфузионной поддержкой.

Застряло инородное тело

Иногда кашель вызывают инородные предметы, травмирующие гортань и трахею, ведь именно в этой области – наибольшее количество кашлевых рецепторов. Многие кошки любят полакомиться куриными костями или стащить кусок рыбы. Лечение в данном случае – хирургическое или эндоскопическое, также может потребоваться антибактериальная терапия. Иногда к кашлю ведет скопление в грудной клетке жидкости (гидроторакс) или лимфы (хилоторакс), здесь для постановки точного диагноза понадобится пункция грудной клетки.

Порой агентом-раздражителем становится скопившийся в грудной клетке воздух (пневмоторакс). Чаще всего это происходит после падения кошки с высоты или после неудачной встречи с собакой. Если ваш питомец попал в подобную передрагу, ему срочно необходима помощь врача и рентгенодиагностика, ведь воздух в грудной клетке спо-

собен скапливаться очень быстро, что может привести к ателектазу (спаданию) легкого и удушью. Также иногда падение может привести к разрыву диафрагмы и попаданию органов брюшной полости в грудную клетку. Это так называемая диафрагмальная грыжа, которая тоже вызывает кашель и затрудненное дыхание.

Другие возможные причины

Отдельно стоит выделить скопление гноя (пиоторакс), потому что это часто становится сюрпризом даже для очень внимательных владельцев. Причина в том, что во время драк кошки часто травмируют друг друга когтями, и если рана была проникающей и в грудную клетку попала инфекция, это ведет к воспалению и накоплению гнойного инфильтрата, только вот зачастую найти место повреждения не удастся, так как оно быстро заживает и не заметно в густой кошачьей шерсти.

Онкологическое поражение легочной ткани

У кошек бывают как первичные опухоли легких, так и метастатические изменения. Чаще данной патологией страдают животные старше 8–10 лет. В диагностике кашля сложно обойтись без помощи рентгена, также могут понадобиться специфические тесты (анализ на инфекционные заболевания и паразитов, диагностические пункции и т.д.). Наиболее продвинутой в диагностике считается бронхоальвеолярный лаваж легких – процедура, позволяющая получить смыв со слизистой дыхательных путей. Она выполняется под анестезией и требует особых навыков от врача. Кашель кашлю рознь, в каждом конкретном случае подбирается индивидуальное лечение, но это – всегда тревожный симптом, требующий внимательности от вас и вашего доктора.



ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ ДИВОПРАЙД

20 ТАБЛЕТОК

ТОВ «ДИВОПРАЙД»
Відділ реалізації:
Україна, 04208, м. Київ,
вул. Гонгадзе, 35
т./ф.: +38 044 426 77 65
e-mail: divopride@gmail.com
www.divopride.com

ДИВОПРАЙД ГЕПАТОПРОТЕКТОР
Кормова добавка

50 ТАБЛЕТОК

Призначений для профілактики хвороб та відновлення печінки

ТОВ «ДИВОПРАЙД»
Відділ реалізації:
Україна, 03040, г. Київ,
вул. Гонгадзе, 35
тел./факс: +38 044 426 77 65
e-mail: divopride@gmail.com
www.divopride.com