



Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №2 (6) 2012

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРОМЫВАЕМ ГЛАЗА

В каких случаях и как промывать глаза собакам и кошкам?

Итак, в каких же случаях нужно промывать глаза?

- Для профилактики (незначительные красно-коричневые корочки во внутреннем углу глаза, небольшие слезоподтеки);
- Перед применением лекарственных препаратов;
- При попадании раздражающих химических веществ в глаза;
- НЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ!

Как промывать глаза?

Шаг 0. Подготовить инвентарь.

Выбрать и приготовить раствор для промывания глаз. Подготовить стерильные марлевые салфетки или чистые хлопковые диски.

Шаг 1. Поймать и зафиксировать зверя.

Если у вас маленькая юркая собачка, — закутайте ее в полотенце или посадите в узкую переноску, из которой будет торчать одна голова. Большую или спокойную собаку можно посадить в ванную или раковину.

Шаг 2. Тщательно помыть руки с мылом!

Шаг 3. Размочить корочки.

Намочите салфетку в подготовленном растворе и промачивайте закрытые веки и загрязненную область вокруг них в течение нескольких минут.

Затем безболезненно и аккуратно снимите размоченные корочки с шерсти. Если после этого глаз не раскрылся и все еще зажмурен — не пытайтесь его самостоятельно открыть. Свяжитесь с врачом-офтальмологом!

Шаг 4. Промыть глаз.

Промывать глаз, а точнее роговицу и конъюнктиву, удобнее из стерильного 20 мл шприца со снятой иглой, чистой спринцовки или обильно смоченной в растворе салфетки. Наберите раствор для промывания. Большим и указательным пальцами левой руки раздвиньте веки (позовите соседей поддержать вертикальную голову). Раствор лучше наносить в верхний наружный угол, в этом случае он омоет всю поверхность роговицы и конъюнктивальный мешок. При использовании обильно смоченной салфетки, последней возможно нежно протереть конъюнктиву.

Если во время промывания вы заметили посторонние несмываемые частицы, лежащие на поверхности глаза или в складках конъюнктивы, — не трогайте их и не пытайтесь удалить самостоятельно, — срочно бегите к врачу!

Шаг 5. Завершить процедуру.

Окончательно протрите область глаза, веки и шерсть сухой салфеткой по направлению

от наружного к внутреннему углу глаза (от уха к носу).

Что делать при попадании химических раздражающих веществ в глаз?

Шаг 1 и единственный.

Спасти глаз.

Если произошло ЧП с попаданием химических веществ в глаза вашей собаке или кошке, немедленно хватайте зверя и несите в ванную под теплую (25°C) струю проточной воды. В течение длительного времени (15-20 минут) обильно промывайте раскрытый глаз!

Если рядом нет проточной воды, магазина с питьевой водой, и даже крынки молока, — уменьшить тяжесть поражения глаза возможно путем просушивания глазного яблока кусочком ваты или другой хорошо впитывающей ткани. Для этого прижмите кусочек ткани к области слезного озерца (кармашка, который образуется, если оттянуть нижнее веко).

Если Вы самостоятельно решили назначить антибиотикосодержащие глазные препараты (а в особенности сильнодействующие препараты из групп цефалоспоринов, макролидов, аминогликозидов), — лучше откажитесь от этой идеи и позвоните ветеринару офтальмологу.

В случае, когда глазные капли назначил врач, закапывание проводят по тому же принципу, как и промывание. Ука-

К промыванию глаз прибегают многие владельцы домашних животных еще до визита к офтальмологу, или после назначений ветеринарного врача. Но мало кто понимает всю важность и опасность данной процедуры.

зательный палец левой руки накладываете на верхнее веко, а нижнее веко легко оттягиваете большим пальцем. Используйте чисто вымытую пипетку или шприц (когда к флакону не прилагается специальной капельницы), закапывайте по 1-2 капли.

Подобным образом нанесите глазные мази (напр. 1% тетрациклиновая глазная мазь). Мазь закладывается за нижнее веко по 0, 5-1 см., в аккуратно раскрытый глаз.

После нанесения любого лекарственного препарата (капель, гелей, мазей), необходимо аккуратно сомкнуть веки и слегка помассировать глаз, чтобы дать возможность лекарственному средству равномерно распределиться по поверхности роговицы и конъюнктивального мешка.

Важно выдерживать временной интервал между глазными процедурами. Наносить что либо в глаза после промывания возможно через 5-10 минут, а интервал между лекарственными препаратами должен составлять не менее 15 минут.

Какими растворами промывать глаза?

Растворы для промывания глаз делятся на две группы — специальные коммерческие растворы для промывания глаз и просто подходящие для этой цели растворы.

Растворы, подходящие для промывания:

- физиологический, 0,9% раствор натрия хлорида, стерильный;
- раствор фурацилина 1:5000 (в аптеке на заказ без рецепта);
- 2% раствор борной кислоты;
- хлоргексидин 0, 01% (возможно самостоятельно приготовить из 0, 05% раствора хлоргексидина, для этого 4 мл (0, 05% раствора) надо набрать в 20 миллилитровый шприц, и развести его до 20 мл физиологическим раствором натрия хлорида);
- раствор перманганата калия 1:5000 (это слабо розовый);
- отвар ромашки (Заварить 1 пакетик сухой ромашки на стакан крутого кипятка, или 1 столовую ложку цветов ромашки в рассыпчатом виде залить 200 мл. кипятка. Перед использованием остудить! о Спитый чай (то есть тот, который остался недопитым со вчерашнего вечера);
- вода проточная обыкновенная — из-под крана. (лучше кипяченая, немного теплая).

Все растворы лучше использовать немного теплыми, или комнатной температуры.

Терпенья Вам и здоровья Вашему питомцу.

*Ветеринарный врач — офтальмолог
Александр Константиновский*



КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ПРЕБИОТИКИ

В течение многих лет, для уничтожения или угнетения вредоносных бактерий в теле животного использовались антибиотики. В настоящее время многие ветеринары также рассматривают возможность способствовать росту полезных бактерий в организме животных с помощью питания.

Диетолог Шерри Сандерсон из Университета штата Джорджия говорит: "пребиотики - это группа неперевариваемых ингредиентов корма, служащих источником питания для

собственной микрофлоры толстого кишечника". Полезные бактерии кишечника (комменсалы) вырабатывают энергию для эпителиоцитов, и помогают синтезировать важные питательные вещества.

Одним из наиболее распространенных пребиотиков в кормах являются волокна, например, свекольный жом или другие источники клетчатки.

При попадании в пищеварительный тракт пребиотики проходят в неизменном виде желудок и тонкий кишечник,



а в толстом кишечнике проявляют свои полезные для флоры свойства, избирательно стимулируя рост и метаболическую активность бифидобактерий и лактобацилл. Целью применения пребиотиков является поддержание популяции бифидобактерий толстого кишечника, которые в норме должны преобладать

над другими видами бактерий. При этом не нужно вводить микроорганизмов извне.

При отсутствии пребиотической среды (непереваримой клетчатки) количество полезных бактерий резко снижается, так как для них отсутствует необходимая им для питания пребиотическая среда и их долю в микросреде кишечника займут патогенные штаммы кишечной палочки, дрожжевые грибы, то есть развивается дисбактериоз.

Ежедневное употребление пребиотиков значительно повышает количество бифидобактерий в кишечнике. Количественный рост популяции бифидобактерий подавляет развитие патогенных бактерий, вирусов и грибов, что приводит к улучшению состава кишечной флоры и способствует лучшему выполнению целого ряда биологических функций организмом че-

ловека. Бифидобактерии, способствуют уменьшению риска возникновения злокачественных клеток и уменьшению уровня холестерина и аммония в крови, вырабатывают иммуномодуляторы, витамины группы В, фолиевую кислоту и др.

Введение пребиотиков в состав коммерческих рационов существенно повышает их диетическую ценность.

- Dr. Andrea Looney,
DVM for the "Purina® Animal
Instincts" Podcast Series

информация предоставлена
ТМ «ПРО ПЛАН»
компанией Нестле Пурина

PURINA®
PRO PLAN®

PRO PLAN® Performance

Сильніше, швидше... витриваліше.



Надайте Вашому собаці додаткової енергії, яку він так потребує.

PRO PLAN® Performance, для службових та мисливських собак, розроблений провідними науковцями, містить збалансований рівень жирів та вуглеводів, щоб забезпечити рівномірне вивільнення енергії під час тривалих тренувань та сповільнює процес зношення. Високий рівень білків, що містить м'ясо курки, допомагає відновити амінокислоти, які втрачаються під час тренувань, це сприяє швидкому відновленню м'язових тканин.



Високий рівень енергії



Головний інгредієнт — шматочки свіжої та якісної курки

PRO PLAN®. ГОДУЄ І ВОДНОЧАС ЗАХИЩАЄ.

м. Київ: ПП «Берегиня Е.В.» тел.: (099) 121-89-87 (доставка кормів), (050) 313-52-10; м. Харків: ДП «СТВ-Харків» тел.: (057) 761-42-02, (057) 761-33-82 (доставка кормів), (099) 110-50-87; м. Львів: ТОВ «СТВ-ЦЕНТР» тел.: (050) 385-27-42; м. Суми: ТОВ «СТВ-Сівер» тел.: (050) 307-47-32 (доставка кормів), (050) 385-27-42; м. Кременчук: ДП «СТВ» тел.: (050) 385-27-42; м. Одеса: тел.: (050) 399-32-63 (доставка кормів), (050) 358-27-03; м. Миколаїв: (050) 316 69 51 (доставка кормів); м. Херсон: (050) 385 27 83 (доставка кормів); м. Донецьк: ПП «Вит Торг» тел.: (062) 332-81-32/33-57, (050) 358-17-74 (доставка кормів); м. Сімферополь: ПП «Берегиня Е.В.» тел.: (050) 324-73-11 (доставка кормів), (099) 959-15-67; м. Дніпропетровськ: (050) 358-34-78 (доставка кормів); м. Запоріжжя: (067) 916-66-97 (доставка кормів); м. Хмельницький: (068) 246-80-70 (доставка кормів); м. Чернігів: ТОВ «Ікар» тел.: +38 (0372) 51-50-94, факс: (0372) 58-44-00 (доставка кормів), (050) 311-40-61; м. Мукачеве: ТОВ «Закарпатська Продовольча Група» тел.: (03131) 5-44-29, (03131) 5-44-32, (050) 432-73-92, факс: (03131) 3-77-45, (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. Івано-Франківськ: ТОВ «Маневр» тел.: (0342) 71-06-72, (0342) 71-06-73 (доставка кормів); м. Рівне: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0362) 26-46-18, (0362) 26-46-07 (доставка кормів); м. Луцьк: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0332) 25-22-41 (доставка кормів); м. Тернопіль: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0352) 25-74-10 (доставка кормів); м. Хмельницький: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0382) 64-41-52 (доставка кормів).

Nestlé Purina, ТМ ProPlan – Офіційний Спонсор Федерації Мисливського Собаководства України

PURINA®
Ваш улюбленець – наше натхнення!



ЭКЗОТЫ В ДОМЕ

ЧЕМ БОЛЕЕТ ИГУАНА?

У молодых игуан в возрасте до 2 лет наиболее частыми проблемами являются вторичный пищевой гиперпаратиреоз, травмы, нарушение линьки, паразитозы, отбрасывание хвоста и пролапс (выпадение) органов клоаки. У взрослых игуан часто встречаются заболевания почек, задержка кладки, остеомиелит, камни в мочевом пузыре и инородные тела в пищеварительном тракте.

Молодые игуаны

Вторичный пищевой гиперпаратиреоз

Причинами развития этого часто встречающегося у молодых игуан заболевания являются недостаток ультрафиолета, витамина Д3 и/или кальция, а также содержание при пониженной температуре. В результате метаболических изменений костная ткань замещается фиброзной, вызывая размягчение костей и увеличение конечностей в размере. На рентгеновских снимках можно увидеть снижение плотности костей, наличие патологических переломов и разрастание мягких тканей вокруг трубчатых костей. При критическом снижении уровня кальция в сыворотке у игуан наблюдаются судороги.

Травмы головы

У молодых игуан часто отмечаются повреждения носовой части головы, которые они получают, сильно ударяясь о стекло террариума при попытке бегства. При отсутствии лечения может развиваться остеомиелит.

Эктопаразиты

Игуаны могут быть хозяевами для клещей-красотелок (Trombiculidae), змеиных клещей (Ophryniissus sp.) и клещей ящериц (Hirstiella sp.). Эти паразиты могут вызывать зуд, нарушение линьки, анемию и инфекции кожи. Поражения выглядят как участки утолщенной кожи, более светлой по сравнению с основным фоном.

Эндопаразиты

Чаще всего у молодых игуан встречаются круглые гельминты (оксиуры). Предположительно, нематоды в природе заселяют пищеварительный тракт игуан как симбионты, однако в неволе опасность перезаражения в условиях ограниченного террариума ведет к необходимости дегельминтизации.

Нарушение линьки

Причин нарушения линьки у игуан множество, наиболее частыми являются обезвоживание и поражение клешнями. Игуаны с задержкой линьки выглядят высушенными, с кусочками кожи на различных участках тела. Чаще всего на спинных шипах и пальцах.

Отбрасывание хвоста

У молодых игуан строение хвоста позволяет отбрасывать его в случае опасности. Участок хвоста в этом случае может восстановиться, но чешуи на нем мельче и имеют более темную окраску. При потере хвоста рану обрабатывают антисептическими средствами до заживления.

Выпадение (пролапс) клоаки

Выпадение клоаки у молодых игуан обычно является вторичным по отношению к состояниям, приводящим к болезненным позывам к дефекации, например, хроническая диарея или кишечная непроходимость. Лечение должно быть направлено в первую очередь на обнаружение и устранение основного заболевания, а также хирургическое устранение собственно пролапса.

Взрослые игуаны

Поражение почек

Поражение почек у взрослых игуан встречается чаще всего по отношению к остальным патологиям. В норме почки не прощупываются, поскольку они расположены в тазовой полости. При увеличении почек становится возможным прощупать их передний

или задний край, выходящий за пределы таза.

Обычно игуаны с поражениями почек попадают на прием по поводу отказа от корма, истощения и слабости. Эти симптомы развиваются чаще всего вследствие несоблюдения необходимых условий содержания - температуры, влажности, ультрафиолетового излучения и рациона.

Задержка кладки

В природе для игуан является нормой отказ от пищи в течение 4 недель с момента овуляции до откладки яиц. У содержащихся в неволе игуан часто встречаются проблемы на одной из двух стадий репродуктивного цикла. Первая - на стадии овуляции, когда зрелые фолликулы по тем или иным причинам не овулируют, и остаются в яичниках (фолликулярный стаз). Вторая - задержка яиц в яйцеводах дольше обычного времени (задержка кладки).

Остеомиелит

Воспаление костной ткани - тяжелое заболевание игуан, сопровождающееся разрушением пораженных костей и окружающих тканей. Зачастую сопровождается формированием абсцессов в печени и почках и сепсисом.

Камни в мочевом пузыре

Возможность наличия камней в мочевом пузыре должна учитываться, когда на прием поступает взрослая игуана с увеличением живота, отказом от корма и болезненными позывами к мочеиспусканию и дефекации. Обычно эти камни одиночные и хорошо прощупываются. Большинство камней видны на рентгеновских снимках в форме округлых образований слоистой структуры в проекции мочевого пузыря, они состоят из мочевой кислоты и фосфата магния. Причину их образования установить удается не всегда. Считается, что существенную роль играет хроническое обезвоживание, болезни почек, недостаток



активности и нарушения в рационе. Лечение хирургическое.

Инородные тела

в пищеварительном тракте

Игуаны, содержащиеся вне террариума предрасположены к заглатыванию инородных тел, поскольку по природе своей очень любопытны. Игуан привлекают яркие цвета и блестящие предметы. Питаясь, эти ящерицы пробуют на вкус корм при помощи липкого кончика языка. Таким обра-

зом, они могут заглатывать плоские предметы - монеты, пуговицы, скрепки и т.д. Большинство из них легко проходят пищеварительный тракт, не причиняя игуане вреда.

Часто посторонние предметы задерживаются в области дна желудка или слепой кишки, не вызывая никаких проблем годами. С другой стороны, при длительном присутствии металлических предметов в пищеварительном тракте возможна хроническая интоксикация.



Відхаркувальний та протикашлевий засіб.

ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ ДИВОПРАЙД



20 ТАБЛЕТОК



Спільне виробництво
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:

Україна, 03040, м. Київ,
вул.Васильківська,16
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com



www.divopride.com

ВЕТСУРФАГОН
(Surfagon)

НАЙКРАЩИЙ ВИБІР для лікування симптоматичної неплідності та підвищення запліднюваності маточного поголів'я с/г тварин

УКРВЕТПРОМПОСТАЧ
07403 Київська обл.,
м. Бровари, вул. Будьонного, 23-а
тел./факс: (045 94) 5-54-13, 6-48-49, 6-42-95
www.vetsnab.com.ua
e-mail: info@vetsnab.com.ua

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРИУЧАЕМ КОТЕНКА К ТУАЛЕТУ

У каждого владельца пушистого создания существует свой собственный метод приучения кошки к лотку. И все эти методы могут быть совершенно разными и в тоже время правильными, но только для одной конкретной кошки. Главное в приучении котенка к лотку нужно понимать, что могут возникнуть проблемы, и котенок не сразу поймет, что вы от него хотите.

Сначала необходимо навести чистоту в доме, чтобы нигде не пахло кошачьими метками. Все места, где котенок успел сходить в туалет необходимо хорошо вымыть, но не хлоросодержащим средством, так как хлорка только усилит запах мочи. Сейчас в продаже есть специальные средства, разработанные для кошек, которые устраняют все неприятные запахи.

Какие-то кошки предпочитают лоток с наполнителем, другим нравится пустой лоток, третьим достаточно порванной бумаги в лоточке, а четвертые и вовсе на унитаз ходят. Поэтому для начала попробуйте все варианты. Но стоит сразу предупредить о наполнителях! Старайтесь не покупать ароматизированные, лучше всего из натурального продукта (глина, песок, древесная стружка). Не забывайте мыть лоток после каждого посещения. Если лоток застоялся, то котенок просто напросто пойдет искать другое место для справления своих нужд. С наполнителем гораздо проще, его можно менять раз в день, некоторые даже раз в три дня.

Лоток обычно располагают в туалете или в ванной комнате. Для начала просто посадите котенка в лоток, пусть он его обнюхает. Покопайтесь в нем немного, потом покажите котенку, что здесь нужно закапывать. Возьмите его лапку и сделайте несколько копательных движений. Обычно если со здоровьем у котенка все в порядке, лоток чистый, наполнитель его устраивает, то он сразу поймет, что это его туалет.

Если котенок успел уже сходить мимо лотка — главное его не запугать. Просто присматривайте за ним. Как только увидите, что он ищет, где бы ему присесть, или уже присаживается, тихонько подойдите и очень аккуратно и ласково, с поглаживаниями его берите и несите в лоток. Только ни в коем случае не резко, без криков и без ругани. А после того, как сходит, похвалите. А если будете ругаться и наказывать, а после этого сразу нести в лоток, то он у вас лоток возненавидит и ходить в него перестанет вообще."

Не тыкайте мордочкой котенка в лужу!!! Это даст обратный эффект. Лучше возьмите кусочек туалетной бумаги, обмакните в мочу и положите в лоток. Посадите туда же котенка и сделайте его лапкой несколько копательных движений.

Если котенок ходит и в лоток, и мимо

Полезный совет: "Прекрасно, что он у вас ходит и в лоток тоже. А почему ошибается - могут быть разные причины. Либо он просто еще не понял, что надо ходить ТОЛЬКО в лоток, и использует разные варианты, по настроению. Либо ему что-

то иногда не нравится в лотке. Или у него что-то болит."

Можно обработать нежелательные места для туалета нашатырем плюс лимон. Запах выветрится, но кошка его будет чувствовать. Еще кошки не переносят запахи цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин), поэтому можно выложить корки апельсина или лимона. Но не все! Некоторые кошки даже едят эти корки. В таком случае, чтобы отпугнуть котенка от того места, где он ходит в туалет, но мимо лотка, можно обработать это место антигадином, прежде обязательно все вымыть. А в лоток добавить средство для приучения к месту. Такие средства обязательно будут продаваться в любом зоомагазине.

Иногда причиной испражнения в недозволенном месте могут быть соседские или просто чужие кошки, которые помели подвезд. Таким образом ваш питомец защищает свою территорию.

Причины могут быть разные, поэтому не стоит сразу думать, что кошка делает это из вредности или мести. Наберитесь терпения и вскоре ваш любимец будет ходить в туалет в специально отведенное для этого место.



ОЧЕВИДНИЙ ЭФЕКТ ВІД ПЕРШОЇ ІН'ЄКЦІЇ

ТімТіл®

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ З УНІВЕРСАЛЬНО-ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ

Комбінація з двох взаємно посилюючих один одного антибіотиків – Тіамуліну і Тилозину – забезпечує універсально широкий і надійний спектр дії проти основних епізоотично-значимих мікроорганізмів.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для лікування і профілактики захворювань свиней, великої рогатої худоби, овець і кіз.

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ бездоганну дію проти збудників:

- ілеїту,
- мікоплазмозів,
- спірохетозів,
- рикетсіозів,
- трепонемозів,
- хламідіозів.

ТОВ «Брoвaфaрмa», бульвар Незалежності, 18а м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: +38 (04594) 6-63-19, 6-63-20, 6-26-25
e-mail: office@brovafarma.com.ua, www.brovafarma.com.ua

bioveta АНТИГЕЛЬМИНТНИЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЯВНОСТІ

КАНИВЕРМ
Caniverm

Таблетированный антигельминтик для собак и кошек

Дегельминтизацию животных можно проводить уже с 3-х недельного возраста

Возможно использование для беременных и лактирующих животных

Не оказывает сенсibiliзирующего действия

Удобная фасовка для разных возрастных категорий

Эксклюзивный представитель Bioveta (Чехия)
03036, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 92 Б, а/я 44
тел.: 229-77-55, тел./факс: 246-20-05, 246-20-06
www.eurovet.com.ua