



Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №3 (3) 2011

ЗДОРОВЬЕ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Насморк (ринит) у кошек может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом других заболеваний. Выделения из носа могут быть водянистыми, слизистыми и гнойными.

Если выделения идут из одной ноздри, то скорее всего это не простой насморк, часто это указывает на новообразование в носовых ходах, здесь консультация врача обязательна. Следует отметить, что даже обычный насморк у кошек, если его не лечить, может перейти в хронический. Хронический насморк практически не поддается лечению. Поэтому целесообразно сразу же обращаться к ветеринару.

Насморк также может быть аллергического происхождения, первым признаком бронхиальной астмы (не редкость у кошек!).

Однако чаще всего в своей практике ветеринарный врач сталкивается именно с вирусными заболеваниями органов дыхания кошек. На сегодняшний день наиболее актуальными заболеваниями дыхательной системы кошек являются герпесвирусный ринотрахеит и калицивироз - их объединяют в так называемый респираторный симптомокомплекс, характеризующийся в основном катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, ротовой полости и конъюнктивы.

Инфекционные респираторные болезни кошек вызываются одним или несколькими

ПОЧЕМУ ЧИХАЕТ КОШКА?

ми возбудителями вирусной и/или бактериальной природы. Кроме герпес- и калицивируса, к возникновению "кошачьего ОРЗ" причастны и бактериальные возбудители: бордетелла, хламидии и микоплазмы. Вирусы являются пусковым фактором, позднее к ним присоединяются и бактериальные организмы.

Вирусные возбудители данной группы инфекций в основном неустойчивы во внешней среде и сохраняются в сухой среде не более 1-2 суток, а во влажной - до 10 суток, чего нельзя сказать о бактериальных возбудителях - они, как правило, выживают и более суровых условиях.

Основным резервуаром инфекции являются больные кошки или животные-реконвалесценты, у которых наблюдается длительное вирусоносительство. Наиболее часто распространение заболеваний отмечается при групповом содержании животных (питомники и приюты), а также после проведения выставок, племенных смотров и т.д. При изолированном домашнем содержании заболевание встречается относительно редко.

• Герпесвирусная инфекция

Инкубационный период при герпесвирусной инфекции кошек обычно составляет 2-6 дней, при калицивирусной инфекции - от 3 до 19 дней.

Клинические формы и динамика проявления заболева-

ний отличаются большим многообразием.

Сверхострое течение наблюдаются наиболее часто при герпесвирусной инфекции у котят в возрасте от 1 недели до 1,5 месяцев. Заболевание начинается внезапно, из-за сильной отечности слизистой оболочки носоглотки и ротовой полости котят не могут сосать молоко у матери и погибают в течение суток. Другие клинические симптомы не выражены.

При острой форме первыми симптомами болезни являются депрессия, анорексия, повышение температуры тела до 40-41°C, резко выраженная болезненность живота, метеоризм, набухание слизистых оболочек носоглотки и ротовой полости, частое чихание. В дальнейшем отмечают обильные истечения из носа и глаз, сильное слюноотечение, одышку и кашель. Кроме того, часто наблюдают острые серозные и гнойные конъюнктивиты, которые осложняются язвенными кератитами.

При подостром течении болезни у животных наблюдают сходные клинические признаки, но они слабее выражены и развиваются в течение более продолжительного времени - 2-3 недели.

Хроническое течение болезни у животных часто отмечают при наличии вторичных бактериальных инфекций, вызывающих вялотекущие бронхиты, пневмонии или бронхопневмонии. При этой форме болезни обычно наблюдается длительное вирусоносительство. Характерно, что выделение вируса начинается не сразу, а после перенесенного животным сильного стресса (перевозка кошек на новое место, в ветеринарную клинику, смена

хозяев, применение гормональных препаратов и др.).

Скрытая (латентная) форма болезни не проявляется клиническими признаками, однако кошки со скрытой формой болезни также являются вирусоносителями.

• Калицивирусная инфекция

Острое течение болезни характеризуется угнетением, кратковременной лихорадкой, анорексией, отечностью слизистых оболочек носовой и ротовой полости, а также выделениями из носа и глаз (менее обильными, чем при герпесвирусной инфекции). Нередко наблюдается чихание, кашель и умеренный конъюнктивит. Важнейшим диагностическим симптомом являются изъязвления на носовой перегородке и в полости рта: на языке, мягком и твердом нёбе, губах. Болезнь продолжается 1-2 недели и заканчивается обычно выздоровлением при отсутствии вторичных инфекций.

У котят калицивирусная инфекция часто имеет неблагоприятное течение и осложняется развитием вторичных бактериальных инфекций, вызывающих гастроэнтериты, бронхиты и бронхопневмонии. Это наблюдают в основном у котят в возрасте 1-3 месяцев, когда у них заканчивается колостральный иммунитет.

Хроническое течение болезни, как и при герпесвирусной инфекции, наблюдают в основном при развитии вторичных бактериальных инфекций. Эта форма представляет опасность ввиду того, что больные животные являются длительными вирусоносителями.

Диагностика

Ввиду многообразия клинических признаков различных форм инфекционных респираторных болезней кошек точный диагноз устанавливают на основании лабораторных исследований.

Прогноз зависит от вида возбудителя, его вирулентности, состояния иммунной системы животного и формы течения болезни. При сверхостром течении прогноз обычно летальный, при остром и подостром течении - благоприятный или неблагоприятный, в случае развития смешанных инфекций прогноз нередко летальный. При хронической форме длительный

прогноз, как правило, неблагоприятный. Летальность при остром течении герпесвирусной инфекции у котят составляет 20-30%, а при калицивирусной инфекции - около 30%.

Лечение

При инфекционных респираторных болезнях кошек осуществляют индивидуальную комплексную этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию.

Для подавления вторичных инфекций рекомендуются антибиотики широкого спектра действия. В случае обезвоживания организма для восстановления электролитного баланса проводят интенсивную регидратацию.

Иммунитет

Иммунитет после перенесенной герпесвирусной и калицивирусной инфекций непродолжительный - около 6 месяцев, животные нередко становятся латентными носителями.

Профилактика

Единственный способ эффективной профилактики - применение поливалентных вакцин.

Помните - вакцинации подлежат только здоровые животные. Вакцинацию проводит только ветеринарный врач.

Общая профилактика вирусных респираторных болезней кошек, так же как и при других инфекциях, направлена на строгое соблюдение ветеринарно-санитарных и зооигиенических правил кормления, ухода и содержания кошек. Учитывая, что наибольшее распространение данные болезни имеют при групповом содержании животных, необходимо предусматривать обязательное карантинирование всех животных, поступающих в питомники и приюты.

Особо следует подчеркнуть необходимость контрольной диагностики на предмет скрытого вирусоносительства всех племенных животных, учитывая большую вероятность полового и внутриутробного заражения. А если учесть, что вирусный ринотрахеит или калицивироз кошек, аденовирус и чума у собак начинается, как правило с насморка - можно в течение 5 - 10 дней потерять животное. Для молодых животных эти вирусы смертельно опасны.



КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ КОРМЛЕНИЯ СОБАК

Чего делать не следует

Владельцам собак известно, что для составления собственного сбалансированного рациона питания кулинары используют самые разнообразные продукты, смешивая их в различных комбинациях и получая при этом различные блюда. В кормлении собак все несколько по иному - высококачественные корма изначально сбалансированы по всем питательным веществам, имеют прекрасные вкусовые качества и не требуют "оптимизации" со стороны владельца.

Добавление человеческой пищи к сбалансированным коммерческим кормам может нарушить баланс питательных веществ в диете вашего домашнего любимца. В идеале, никакие остатки со стола не должны скармливаться собаке. Если собака будет рассматривать ваш стол как источник вкусняшек, вы также рискуете спровоцировать поведенческие проблемы у вашей собаки - она попросту может начать воровать пищу со стола или кухонной зоны. Попробуйте кормить собаку регулярно

но по расписанию, подобно тому как вы завтракаете или ужинаете с семьей. Для поддержания вашей собаки в хорошем состоянии абсолютно достаточно правильного сбалансированного кормления. Игнорируйте "уговоры" в виде сидения около стола и умильного поскуливания - используйте принцип "объятия вместо подкармливания".

Это важно знать:

- Молоко - один из видов пищи, а не заменитель воды.
- Частое добавление сырых яиц в рацион собаки может вызвать дефицит витамина биотина, что чревато развитием дерматитов, выпадением волос и ухудшением роста.
- Частое скармливание сырой рыбы может привести к дефициту тиамина. Признаки дефицита тиамина включают анорексию (полная потеря аппетита), слабость, судороги и даже смерть.
- Сырое мясо может содержать паразитов и бактерии, и не имеет надлежащего баланса питательных веществ, если скармливается без других



продуктов. Хотя мясо является источником белка, оно содержит низкий уровень кальция — минерала, который необходим для правильного роста костей и зубов. Если растущая собака питается сырым мясом в течение долгого времени, могут раз-

виваться проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

- При ежедневном скармливании больших количеств сырой печени, существует риск гипервитаминоза витамина А.
- Не давайте собаке кости - несмотря на вбитый с детства в наше сознание стереотип "собачки с косточкой в зубах", кости, даже мягкие и небольшого размера могут создать массу проблем - от застревания между зубами до смертельно опасных случаев непроходимости пищевода, кишечника и т.д.

мулирует моторику кишечника и нормализует время прохождения фекальных масс через кишечник, также способствуя достижению нормальной консистенции фекалий.

Ферментирование клетчатки микроорганизмами, которые обитают в желудочно-кишечном тракте, обеспечивает клетки, выстилающие желудочно-кишечный тракт, энергией и способствует их нормальному функционированию.

Источниками пищевых волокон в кормах для собак являются мякоть свеклы, рисовые отруби, соя, яблочный и томатный жмых, цитрусовые, шелуха арахиса, отруби овса, риса, пшеницы и целлюлоза. Также используются твердые остатки мякоти (выжимки), которые остаются после изготовления соков из фруктов или овощей; выжимки относятся к мякоти плодов.

Исследования показывают, что волокна медленно перевариваются в кишечнике, что помогает регулировать поглощение сахара из кишечника, и, соответственно, контролирует уровень сахара в крови.

При оценке роли волокон в диете собаки, старая поговорка "больше не значит лучше" как никогда справедлива. Чрезмерное потребление пищевых волокон связано с неблагоприятными эффектами, такими как жидкий стул, метеоризм, а также увеличение объема стула. Авторитетные производители кормов обеспечивают сбалансированное питание собак при сохранении надлежащего уровня волокон в рационе.

О пищевых волокнах

Возможно, осведомленность о преимуществах пищевых волокон в диете человека побудило владельцев домашних животных узнать побольше об их преимуществах в продуктах для их домашних любимцев. Отведенная изначально скромная роль наполнителя сегодня абсолютно не соответствует действительности - пищевые волокна получили признание благодаря позитивному влиянию на желудочно-кишечный тракт и пищеварение в целом.

Волокна (в основном, клетчатка растений) являются трудноперевариваемыми, но несмотря на ограниченную усвояемость, они очень важны.

Клетчатка играет важную роль в специальных диетах, предназначенных для снижения и контроля веса. Клетчатка помогает уменьшить калорийность диеты и обеспечивает чувство насыщения.

Тем не менее, сами по себе диеты с высоким содержанием клетчатки не обеспечат снижения веса. Строгий контроль порций также необходимо для успешной реализации программы по снижению веса, которую вы спланируете с ветеринарным специалистом.

Хорошо известно значение волокон для минимизации запоров. Клетчатка поглощает воду и придает объем кишечному содержимому. Это сти-



Ваш улюбленец - наше натхнення.



«Удосконалений природний захист» підтримує зовнішню та внутрішню захисні сили організму Вашого kota.





ШКИРА ТА ШЕРСТЬ
Вітамін Е, ліноленова кислота та цинк для зволоження та еластичності шкіри. Незамінні морські олії для густоти та блискучості шерсті.



СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ
Цільні зерна рису та інших зернових - для легкого травлення та кращого засвоєння поживних речовин.



СЕЧОВИДНА СИСТЕМА
Незамінні мінеральні речовини та контроль рівня рН для здоров'я сечовидної системи. Містить комплекс Optirenal (Оптіренал) для підтримки функції нирок.



ІМУННА СИСТЕМА
Високий рівень протеїну та потужні антиоксиданти для вироблення антитіл. Ідеальна формула для Вашого kota.



Годує і водночас захищає!

м. Київ: ПП «Бережний Е.В.» тел.: (095) 121-89-87 (доставка кормів); (050) 313-52-10; м. ХАРКІВ: ДП «СТВ-Харків» тел.: (057) 761-42-02, (057) 761-32-82 (доставка кормів); (095) 110-50-87; м. ПОЛТАВА ТОВ «СТВ-ЦЕНТР» тел.: (050) 385-27-42; м. СУМИ ТОВ «СТВ-Сівер» тел.: (050) 307-47-32 (доставка кормів); (050) 385-27-42; м. КРЕМЕНЧУК ДП «СТВ» тел.: (050) 385-27-42; м. ОДЕСА: тел.: (050) 395-32-63 (доставка кормів); (050) 358-27-03; м. МИКОЛАЙ ТОВ «СТВ-Міко» тел.: (050) 316-69-51 (доставка кормів); м. ХЕРСОН (050) 385 27 83 (доставка кормів); м. ДОНЕЦЬК: ПП «Філі Тор» тел.: (062) 332-81-32/33/37; (050) 358-17-74 (доставка кормів); м. СИМФЕРОПОЛЬ: ПП «Бережний Е.В.» тел.: (050) 324-73-11 (доставка кормів); (099) 959-15-67; м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК: (050) 358-34-78 (доставка кормів); м. ЗАПОРІЖЖЯ: (067) 916-66-97 (доставка кормів); м. КИРВИЙ РІГ: (098) 246-80-70 (доставка кормів); м. КІРОВОГРАД: (050) 457-24-57 (доставка кормів); м. ЛЬВІВ: ФОП «Сінгх Б.К.» тел.: (0322) 41-82-80; (063) 222-52-40; факс: (0322) 41-82-81; (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. ЧЕРНІВЦІ: ТОВ «Клас і Ки» тел.: +38 (0372) 51-50-04; факс: (0372) 58-44-00 (доставка кормів); (050) 311-40-61; м. МУКАЧЕВО: ТОВ «Закарпатська Продовольча група» тел.: (03131) 5-44-29; (03131) 5-44-32; (050) 432-73-92; факс: (03131) 3-77-45; (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. ВІДНО-ФРАНКІВСЬК: ТОВ «Манер» тел.: (0342) 71-06-72; (0342) 71-06-73 (доставка кормів); м. РІВНЕ: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0362) 26-46-18; (0362) 26-46-07 (доставка кормів); м. ЛУЦЬК: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0332) 25-22-41 (доставка кормів); м. ТЕРНОПІЛЬ: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0352) 25-74-10 (доставка кормів); м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0382) 64-41-52 (доставка кормів).

інформація предоставлена
ТМ «ПРО ПЛАН»
компанії Нестле Пурина

PURINA®
PRO PLAN®

ЗДОРОВЬЕ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Беременность - особое состояние организма животного, когда нагрузки на все системы и органы возрастают в несколько раз, обостряются хронические процессы, могут возникнуть и новые проблемы со здоровьем, поэтому необходимо очень ответственно отнестись к возможности получить от вашей собаки или кошки потомство.

О БЕРЕМЕННОСТИ

Планируя беременность вашей собаки или кошки, необходимо быть уверенным в том, что его состояние здоровья позволит благополучно выносить и родить здоровое потомство. Надо заранее позаботиться о профилактических прививках и дегельминтизации, сбалансировать рацион и начать давать дополнительно фолиевую кислоту. По данным французских исследователей, дополнительная дача фолиевой кислоты до и во время беременности снижает частоту возникновения такого порока, как расщепление верхнего неба и несращение губ у брахиоцефальных пород собак (боксеры, французского и английского бульдога, мопсов, пекинесов и т.д.) и персидской породы кошек.

Диагностировать беременность можно с 3-х недель - в это время оплодотворенные яйцеклетки имплантируются в

стенку матки и закрепляются на ней (стадия ампул), их можно увидеть с помощью УЗИ, а также пальпировать через брюшную стенку. Можно также диагностировать беременность у собак с помощью лабораторных исследований. С 6 недель рентгенографически выявляются кости черепа и ребра эмбрионов, с 7-ми недель прослушиваются отдельные плоды в матке, а с 8-ми можно проследить их сердцебиение. Делать УЗИ имеет смысл для максимально точной диагностики беременности и определения жизнеспособности эмбрионов. При больших пометах подсчет плодов сильно затруднен, поэтому, если необходимо знать точное количество щенков или котят делают рентгеновский снимок.

Во время беременности изменяется обмен веществ, потребность в энергии возрастает,

поэтому правильное, сбалансированное питание необходимо для благополучия матери и плодов. Если вы кормите свое животное сухими кормами - переходите на питание для беременных и кормящих и добавляйте фолиевую кислоту, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить животное всеми питательными веществами. Если даете натуральные продукты - то обязательно нужны витаминные и минеральные добавки, ведь потребность в кальции, железе, йоде, витаминах возрастает в 2-2,5 раза, а натуральные продукты не содержат достаточное их количество.

Не перекармливайте животных, прибавка в весе за беременность не должна превышать 20 % от массы тела до вязки! В течение первых 3-х недель здоровая собака или кошка будет мало прибавлять в весе, у многих в этот период снижается аппетит, появляется тошнота и даже рвота. Во второй половине беременности собаки и кошки, несмотря на аппетит, могут даже худеть, не успевая накапливать достаточное количество питательных веществ.

У беременных самок появляется жажда, в крови увеличивается количество лейкоцитов, повышается СОЭ, объем циркулирующей крови становится больше, набухают молочные железы и появляется молозиво. Поэтому возрастает нагрузка на сердце, почки, печень и т.д. Из-за повышенного внутрибрюшного давления, вызванного увеличившейся маткой может возникнуть дискомфорт на последних неделях беременности, и опять возникнуть анорексия, поэтому дневной рацион лучше разбить на несколько кормлений небольшими порциями.

Беременным животным необходимы сбалансированные физические нагрузки, лучше всего для этих целей подходят спокойные прогулки умеренной длительности. На поздних сроках противопоказаны быстрый бег и прыжки, т.к. возможны травмы плодов, перекрут и разрыв матки.

Период беременности требует особого внимания владельца, необходимо пристально следить за всеми изменениями здоровья животного, избегать стресс-факторов, профилактировать инфекции и инвазии, вовремя обращаться за консультацией к специалистам. При соблюдении всех этих рекомендаций шансы вашего животного на благополучные роды и здоровое потомство значительно повысятся, и вы сохраните ваше время, нервы и деньги.

ЗАПОМНИТЕ: ВЯЗОК "ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ" НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Если щенки и котята не нужны, а животное не племенное, откажитесь от этого сразу - здоровья такая вязка не прибавит, а проблем может возникнуть достаточно. Особенно это касается уже немолодых животных, старше 4-5 лет. Согласно последних мировых тенденций, животных, котрых не планируют использовать для племенных нужд, лучше стерилизовать.

Перед самой вязкой желательно показать животное ветеринарному врачу, возможно, сдать анализы крови, чтобы проверить состояние печени, почек и других внутренних органов, отсутствие анемии и хронических воспалительных процессов.

Нормальная беременность длится около 61 дня (обязательно зафиксируйте дату вязки - это необходимо для вычисления вероятной даты родов), но у разных пород могут быть отклонения на 2-3 дня в большую или меньшую сторону.



КРУГОВАЯ ЗАЩИТА от ПАРАЗИТОВ



● **Брованол-М**
надежная защита котят и щенков от инвазий, вызванных личинками и взрослыми гельминтами пищевого тракта

● **Брованол плюс**
комплексная защита взрослых собак от гельминтов и экто-паразитов (блох, вшей, клещей)

● **Офтальмо-гель**
эффективная защита от отитов паразитарной этиологии у собак и кроликов (нотоздроз, отодектоз, псороптоз, саркоптоз, хориоптоз, хейлетиоз)

● **Салфетки**
дезинфицирующее средство для ухода за животными и санации инвентаря



бровафарма®
www.brovafarma.com.ua

Украина, 07400, г. Бровары, б-р Независимости 18а
тел./факс: +38 (04594) 6-6319, 6-6320, 6-2625, e-mail: brovafarma@ukr.net
Система управления качеством согласно ДСТУ ISO 9001-2001



Засіб детоксикації - видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів

ДИВОПРАЙД
СОРБЕНТ
20 капсул

Спільне виробництво
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16
тел.: (+380 44) 221-17-79, 257-63-11, 227 07 89
E-mail: zoovet@i.kiev.ua www.ukrzoovet.com.ua

У К Р В Е Т П Р О М П О С Т А Ч

07403 Київська обл.,
м. Бровари, вул. Будьонного, 23-а
тел./факс: (045 94) 5-54-13, 6-48-49, 6-42-95;
www.vetsnab.com.ua
e-mail: info.vetsnab@gmail.com

КОЛІКРІД ЛІКВІД 10%
колістину сульфат

ЛІНКОМІКС 60%
лінкоміцину гідрохлорид

КОЛІКРІД ПОРОШОК 50%
колістину сульфат

ТИЛОПЛЮС 20%
тилмікозин

МУЛЬТИБІО
ампіцилін
колістину сульфат
дексаметазону ацетат

ШОТАПЕН ПД
бензилпеніциліну прокаїн
бензилпеніциліну бензатин
дигідрострептоміцину сульфат

РИЛЕКСИН 500 ДС
цефалексин

РИЛЕКСИН 200 ЛС
цефалексин

РИЛЕКСИН 15%
ін'єкційний
цефалексин

ГІНОБІОТИК
таблетки піноутворюючі
для внутрішньоматкового застосування.
Для лікування та профілактики
післяпологових інфекцій.

ЛЕКАСЕПТАЛ
мазь антисептичної,
протизапальної
і набрякової дії.

КЛИНИКА

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ -ХЕЛЬ

АРТРИТ

Такса 6 лет срок беременности 5 недель - поступила в клинику с диагнозом артрит коленных и скакательных суставов обеих конечностей. Клинические признаки начали появляться около 6 месяцев назад.

Было назначено:

Траумель по 1,0 мл.- 1 раз в день подкожно или внутримышечно №5;

Цель по 1,0 мл.- 3 раза в неделю, подкожно или внутримышечно - 1 неделю;

Дискус композитум по 1,0 мл.- 3 раза в неделю подкожно или внутримышечно - 1 неделю.

Уже на 3й день после начала лечения отмечалось исчезновение хромоты, появилась двигательная активность, "поднялось настроение", улучшился аппетит. По окончании недельного курса животное выглядело здоровым. Для закрепления эффекта было решено назначить поддерживающую терапию: Цель по 1таблетке - 2 раза в день - 30 дней.

При дежурном осмотре через 3 месяца животное здорово, клинических признаков болезни не наблюдается, лечение прошло без каких-либо побочных явлений. Беременность и роды протекали нормально, помет из 8 щенков здоровы без видимых патологий.

Запорожец Лариса Владимировна.
Врач ветеринарной медицины. Одесса

ВАКЦИНАЦИЯ

Необходимость и важность вакцинации против смертельно опасных заболеваний очень важна. Но на некоторое время вакцинация ослабляет иммунитет, особенно у молодых животных. Также мероприятия, которые проводят перед вакцинацией (изгнание гельминтов) негативно влияют на организм животного в целом (молодых, старых или больных желудочно-кишечными и печеночными патологиями).

Для снижения токсического действия вместе с антигельминтиками нужно давать животному Нукс-вомика-Гомаккорд и Кардуус композитум (в виде питьевых ампул или подкожных инъекций). Эти препараты кроме снижения токсического эффекта усилят работу систем, которые очищают организм.

Во избежание поствакцинальных реакций мы рекомендуем применять Энгистол в качестве растворителя вакцины, или вводить его незадолго до вакцинации.

С помощью препаратов компании -Heel мы достигаем главной цели ветеринарного врача - как можно больше снизить риск и негативное влияние процедуры вакцинации.

Заведующий кафедрой внутренних незаразных болезней и клинической диагностики ОГАУ, профессор, доктор ветеринарных наук Российской Федерации и Украины, академик МАДЕНМ, действительный член Академии ветеринарной медицины республики Армения Чубов Юрий Александрович. Одесса

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

Родовспоможение у первородящих сук, даже при наличии крупных плодов проходит без осложнений и потерь с инъекциями Траумеля. У английских бульдогов роды проходят без кесарева сечения в 50 случаев из 100, при условии применения препарата Траумель до родов, во время родов и по окончании. Некоторые питомники, применяющие Траумель, уже несколько лет не кесарят животных.

Слабая родовая деятельность.

Сука породы доberman, 5 лет. Щенилась 3 раза. Вторые и третьи роды при помощи операции кесарева сечения. Слабая родовая деятельность. На втором месяце четвертой беременности начали применять инъекции препарата Траумель 1 раз в неделю №4. Затем инъектировали в начале, середине и в конце родовой деятельности. Три щенка в помете. Рождение третьего щенка произошло при незначительных вспомогательных манипуляциях ведущего врача.

Яцковец Елена Борисовна, врач ветеринарной медицины, владелица частной клиники, Львов

-Heel
Healthcare designed by nature

-Heel. Baden-Baden. Germany.
/www.heel-animal.com.ua/